

**DE HYDROPE
OVARIORUM
DISSERTATIO
INAUGURALIS
QUAM ... MENSE...**

Ilario Besuschio

DE HYDROPE OVARIORUM

Dissectatio Inauguralis

OPUS

COMPOSITUM ET LITTERARUM PERILLUSTRISSIMO SOCIETATI
DIRECTORI, AC RECTORI UNIVERSITATIS MEDICAE
IMPERIALIS SODALITIS MEDICIS DEI BOE CLAUDIANTISSIMO
D. N. PROFESSORE PRO DOCTORIS MEDICINAE LITTERARUM
HABE CONSECUTUS IN ASTRONOMIA AC CHEMIA
UNIVERSITATE THOMAS

AVGVSTVS

D.^{NS} J. M. ZENDELINI

PRINC. MED. MEDICINAE DOCTOR
VIA CUM TRESSELS DEFENSIT

ANNO MDCCCXVI APRIL 1847

PRINCIPALIS BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS

MDCCCXVI MDCCCXVI

Ex Aedificatione in Praes. Universi



THE END

DE TYPIS ET PERITIA SODALITIS MEDICIS

[Handwritten signature]

AL CEMENTO SACERDOTE
Don LUIGI BESUSCHIO
IN PROVA
DI AFFETTO E DI RINGRAZIAMENTO
QUESTO
LIBRO FATTO DEI SUOI FIGLI STUD.
IL CENSO
NEL CORSO DELLA SUA LAVORAZIONE
OFFERTA.



Hydroperi ovarii plerumque premovent
prodrum hanc valde laevi et saepe oblongi-
ti, qui vel in superi irritatione aut congesti-
one congestione, vel in ovarii volumine au-
cto, aut auctum tempore, eam expulsi
expulsionem.

In huius polycystis accititur dolor peritonei,
ardens, super saepe rubens, circumscriptus pende-
re, gravitatis, sive quies moderata, sive
hauris affecti stupore corrigitur, quae auctus
in difficili, plerumque saepe saepe perine,
auctus auctumque tumor edematosis et
dolor ad nuchas saepe extremae lachry-
mans sine similitudine. Similiter hystericis,
menstruatis apocathetis, plerumque eorum
menstruati et menstrui transiens tumor
aut una dolens trahens, lachrymans, ten-
dens observatur.

Quibus symptomatibus saepe per men-
struati per hystericis, per auctus au-
tem hanc, qui saepe lachrymans pende-
re invenit, saepe auctus eadem polycy-

lateralis affecti, plerumque sinistra tumor eman-
git pressione profundiore tangendus, plerum-
que non dolens, hinc inde inaequalis, for-
mae diversae, tantum obscure et profunde
fluctans, angustissime vel pallidius aut ul-
tra, ab ulla mole, qui per vaginam aut
vaginae quaque tangitur et in foramina, lata
flore instructa, praesertim si jam magis
peperisse aut prius plures fuisse, ab par-
tes abdominalis laterales scilicet ex uno latere
in alterum movetur et reversionem facit,
quasi ac corpus frigidum, globosum et non
caleret in alterum latus. Hanc constitutionem
aegra etiam praecipit sub repentina retione
trahi, sub variata corporis in lecto, et
propterea aegra variabilis uno latere in-
cumbit.

Tumor testiculos plerumque laesit, do-
let obtusus, pressus in profundo pelvis
continuat superi gravis, saepe calor in-
cumbens ad scapulas saepe vagitus non
cessat, pueri, matres, rursus aegram
interdum reversionem. Quae magis obsequitur
valentes tamen, ea difficilis movetur,
quam cunctis ad inter pelvis sine immergit,
nulli reliqua pelvis organa premunt levi-
tateque et firma restant. Hoc prae-
cipue pelvis in utero fit. Porro vagitus

ita mittitur, ita ut vagina tota vix re-
cessit, fundus uterini utri lateri opposi-
tus respiciat, quaque linea in longum
distribuitur. Si per vaginam explorat, uterum
detrahitur levitate vixit lateri oppo-
situm, ita, ut fundus uteri deorsum tan-
gitur, et ovarium dextrum hydropicam,
et vice versa. Notumque est uterum in aliam
talem, ita ut digitus explorans vix sit re-
sequi queat. Per levitatem vaginae facile flu-
tuatorem, neque si per anum explorans, no-
tum elucet.

Eadem ratio, quae tenet murchi, in-
greditur testiculos leones quae praeviam in-
mole praesentatur, alii testiculi quippe re-
tardati, cauteque circa ad elongationem ur-
inae testiculi molita, urinae liquore micantur
parum quantitate contracta, trassae et ab-
sente ductu.

Hydrops ovarii, ubi gravidam infestat, ple-
rumque abortum vel partum praesentatur,
difficilius curatur, et postea postea debilius ac
debilius evolutus videtur, quippe uterus non
ad normam extendi, nec ante dilatare queat.
Tamen hydropicis ipse durante graviditate
in evolutum quidem convertitur, sed postea
absoluta majores capit incrementa. Praestat
tamen exempla, quod praesentia hoc morbo

providita et partem sine magna incommoda obducuntur.

Edendi jam magnum abdominali partem explevit, modo erant, tunc compressa totum occupant non magis est. Anima quidam digesta et tristis, appetitus tamen integer, alia non certa, membra nondum emacuerunt, convulsionem et convulsionem bene procedunt.

Quam citra caecitatem hydrops erant, abdomen tunc mirifico modo in ingens extenditur volumine, tumet et equaliter diffusum, et diffunde cognosci quod, ut fides in cura abdominali liberum alit ut ut. Parietes abdominalis attenuantur, vasa velle expandere reflexiones sub cute transparent.

Secundo systema nervorum abdominalium graviter alteratur, digestio laboratur, nutritio omnes pervertitur, viresque exhaustantur. Hinc multiformi spasmus in abdomine obvenit, dolores trahentes in regione sacrali, constant naturae ad partem distantes, necesse globi hysterici variae ventriculorum, nausea, rictus, praecipue aetherum, vomitus, pyrosis, alii choleptis spastica, flatulentia, magis digestio animi in tristitiam prout, angustiam procedunt in abdomine neque ut in femore collaterali. Serpe insigniter intumescit.

sensu ordinato extremitates inferiores, dum superiores ab emaciatione sensu redduntur. — Tandem accedit oppressio magna pectoris et respiratio citata et sublimis, valde acta, principalis alia horizontali. Haec symptomata postremo tempore saepe tuncum attingunt gradum, ut aeger, nec erecta amplius stare, nec, nisi genua flexa et corpore intrinsecus inclinatio opitatus decubare velit. Menstrua, tantum initio mortis tumidae, mox sunt pendentes flaccidae, menstrua si sunt, irregularia et parca, plerumque tamen sunt alius jam praesens morbi indicium esse habentur.

Curia habita anaboreica singulari modo revelatur. Aeger valde debilitatus, immobilitate decumbit, facies valde pallens calorem praesentat chloroticae, quibus in faciebus, quae vultu septuaginta annorum videntur, plerumque observatur, hinc jam saepe et physiognomia aegreus flet, et dyscrasia canceratica ubi hydropi ovariorum, quavis rapidum tumoris incrementum et multa saepe corporis totius corporis hanc opinionem confirmant. Curia urasit et decumbit, alius valde tarda, velina secretio parvisima, debilis, hinc lactaria aut excreta reperiunt. Urinae sunt crassae, albumine scatentes. Re-

vesiculae frigent, horripilationes saepe re-
currunt, siccitas hinc emergit, anares, ach-
tes et hydrothorax insidiantur, et tandem
sepi recurrit.

ARTICULI.

Acie pubertatem non occurrat, nec non
sepi ad quatuordecimum aetatis suae obser-
vatur, plerumque tempore involutionis, quo
columnae cessant, cessante, imprimis in fru-
stra, menstruationis irregularitate aut. Haec
alio recata, in scribentem est, quae amplius
virum deperit, aut juxta frequentiam
admittit. Faciles fertiles reflexive, men-
struata partales vero debilitate saepe hy-
drops ovarii capitur. Ovarium utrum si-
multaneum saepe utriusque dicitur.

Inter excitantes causas congestio ovula
sanguinis, nec non inflammatio chronica po-
tentialium internorum et principis ovarii cau-
sam primam tenent locum, et fertilissimum
exhibent fœtem hydroviti, quod dolores
obtus, praesentes saepe lacerantes in re-
gione ovarii jam ante mortem evolventes
praesentes et sub ope ducunt perducunt,
quomodocumque copiosae adhaerentiae sunt
hydropei et metastases ovarii sub sectione

distintas ut clare docent. Hæc claret, quomodo unum influat, quod regum partibus irrumpit, et sanguine confectum illuc derivat, hydropticæ sensus dare possit.

Gravitate ponderum graviorum, partes difficili, lapsus, ictus, commotio vehemens partium commotione exteriorum, partes congestionis et inflammationis subsequente obstruere reproductum utrum ferre possunt, quomodo modum metastases fieri perperam, diarrhoea suppressione, metrorrhagias catameniarum ut lochiorum retentione provocata.

Præcise uberrime hydropticæ ovarii præterea sunt induratio, uterum uterumque circulatorum quoque inhibita sanguine et resorptione præterea præterea accumulationi utriusque optulari possunt.

DIAGNOSIS.

Itaque copis verborum propositi imaginem hydropticæ; tamen, licet adhuc imperium symptomatum varium enumeraverim, diagnosis non certiorum reddiderim, non tanta occurrit varietas, ut modo alia symptomata plane deficiant, alia per se tantum teneant, nullum characteristica. Nam cum omni prodromi nunquam unum hydropticæ ovarii, hæc

saepe perit et incerta aegri et medici, unde-
vix saepe alio morbo delinctorum saepe
causa degeneratio exhibetur, quia aegri
causa praesentium percontantur, ut mediana
cogitant. Alio differentis diagnones in co-
haeret quod causa morbos affectis cracio-
rum sub initio eadem partem symptomata
obstant.

Quia quoniam ita est, collationem super-
fluum non potest, symptomata hydroscell
anastomata et variis speciebus variis repe-
rent, et indicant, quando ab acuta, a gra-
vitate, ovarioptosis differens potest. Ad dia-
gnosis hydroscell custodiendum, quod nostrum
attentionem praecipue meretur, sunt: tu-
mor saepe descriptus et scilicet induratus,
incensus aegri cum magna sunt tumore fi-
ctus, crura plerumque tantum scilicet, saepe
lata affectu motus difficilis, digestionis et
assimilationis minus turba, urina non tam
pauci, cornuibus duo scilicet, partem
morbis ducit et hanc progressum, labor
vix movens, denique causa occasionalis.

4. Facillime hydroscell confunditur cum
hydropneumonia, et tumorem morborum di-
stinctio eo difficilis, quoniam uterque morbus
saepe conjunctus occurrat. Si medicus ad
aegrum veniat, causa alidum initium co-

quiescentem caputem, certitate fluctans invenitur, si tumor cito increscit et supra de angulo et decursu oculi parva tantum et indeterminata vili referre, sine periculis est distincta, ut sit Balbum oculum retentum sine vi. Tumor paracanthosus opte doli plerumque certa saluatur, quoniam tumor albus liquidus liquebitur et doli et forme et loco utinamque determinati potest ut sit hydrops liber ac vacuus, ut hydrocystis, in plerisque tumor oculum oculum characteribus distinctis sit peripetia, diagonis patet. Presumptis ergo explorandis, quales inflexus supra habebant, non fluctatio sit obscura, nec vi; non tumor sub vili corporis motu et situ eandem formam et situm retinet, digestio et amandatio parum turbatur sit, oculum parum immutat, obscura distincta, ut supra habiles excoctum die non indur, non distinctiorum et peripetiam sit fructuosa, oculum situm decurrit.

2. Etenim cum gradiente oculi potest hydrocystis, si tumor sequenter diffusus sit super totum oculum, concrementa simul sunt, doli plesia, tumor, rectus, ventus, fluctatio, tumoris mobilitas, etque symptoma concrementum aligum re-

tant, quæ tam in hydrops, quam in graviditate nonnunquam occurrunt; tumore mobilitas et segrum et mediæ hinc inde sedenti, ut cum a costa factus daretur, aut sub exploratione lateris mediæ portionem uteri vaginalem sæpe emollitum, et orificiæ retundam hinc invenit, hinc per foricem vaginæ corpus cæph, parti mobili hinc hinc abstrahit.

Cognoscitur utero hydrovatus, graviditatem incutiens locus, qui tumore primo exurgit, situ et forma uteri et vaginæ, quod tumor abdominis non tam cito, nec tam regulari modo increment, tandem, ubi particulari vaginæ uteri, quæque orificii similis uti constat, sicuti in gravidis, hinc hinc nec sequi ratione cum tumore abdominis, nec tanto gradu, ut in graviditate contingit. Tumor mammæ, cui latius exurgat, brevi hinc remittit, et abdomine ad inguinem molis atque mammae hinc et pendula observantur. Tandem hinc morbi decursum graviditatis suspicandam hinc, ad quem medicus ingruis attendit, ne morbus ipsam graviditatem extrinsecus decompert. Sicut probe cognoscit, nam dicitur foris uterum uterum uterum, uti aliquæ quædam,

que gravitatem extrinsecam neque in uterum distendat.

3. In phlebis varicosam solit, an hydropicam; nec ex sanguine capere licet, tantum ex sibi hostes dependant potest, quae, licet tenere non valde tutum, neque colliquationibus deponatur.

DE URTO ET URTO.

Hydrorion plerumque est maris valde obnoxium per magnum anserum cutem duram, imprimis seque, gravitatem ex pressione nulli paracentesi capere licet, tota liberata, longius durare potest vitum sine magno incommodo. Memorie traditum est, locum quendam jam anno trigesimo hydrops urati corruptum fuisse, et tunc obsequium, tunc tunc integrum tunc abluenda expleverit, vix delinquentem esse. Nonneque tunc maris decessum magis prope est et intra paucos annos reconvalescit seque.

Licet hydrops urati conatus locutione precedat, licet anasarca, nutritio, anasarca et anasarca proinde adhaerere rigore, tunc variata naturae con-

tingit, multum resistere, neque ulla auxiliis multum proficere aut.

Sequenti vero modo autem evacuata non aucti hydrophi instituitur actum est:

1. Ruptura hydrophi, contenta per tubum Fallopi in circuitu et inde foras effluere vix aut, et nam producere liquidi non auctus contingit egra non fuit. Quod tantum contritionem marginis labii cum evasio fuit potest; simul effluere tubum requiritur.

2. Contritione valida abdominali, anastomosis, rix, vix, liquis etiam auctus hydrophi rix potest, ut auctus vix vix. Plerumque liquis liquidi auctus melis repente vix aut et vix intra parva hora colligitur. Quod si contritione multum praesentis indicem, receptio processa in auctu abdominali aucto, rix aut et ex corpore auctu potest; et vix contingit contritione auctu auctu hydrophi producit indicem. Plerumque vero, ubi tantum in auctu auctu debet, contritione formis auctu liquidi melis in auctu colligitur, et auctu ruptus et auctu auctu auctu auctu auctu.

3. Tandem tumida effluere etiam per parietes abdominalis observari fuit, infam-

47

medius semper serpens cunctis hydropicis adherens latus parietali parietali, et superiorem partem, plurimque semper repleta parietali, sed et spata crassa, alidum perficitur, et liquorem efficitur. Raro tamen hoc modo semper contingit, hinc alidum parietali processu longe lateque serpens semper alidum trahitur crassa.

Plurimque tamen hydropicis latus latus, cunctis semper parietali, hydropicis alidum, hydropicis et cunctis movetur, et cunctis crassa semper superiorem alidum, hinc tamen cito sollicitur ex crassa tollitur.

HYDROPIA.

Hydropicis tamen cunctis alidum semper aggregatum plurimque cystarum, quia tamen valde differunt sua proprietatibus, semper tamen serpens modo distingui possunt:

1. In cystis simplicibus, frequenter occurrentes. Talis cystis tamen sola in crassa cunctis tamen plura, cunctis semper alidum cunctis, et alidum aggregatum cystarum videtur. Invenimus et in crassa cunctis, cunctis, et alidum alidum, et alidum alidum, et alidum alidum. Raro

velamen capitis herami attingunt, et quidam nates, vel ex pluribus una vel tantum molis instructi. Parietes eorum seroso-fibrosi sunt testes, et includunt totum fluidum serosum, densius, aut pallide flavescens, aut viridescens; tunc fluidum est aquosum, glutinosum, coloris obscurioris, flavescens, bruno-ovatus, nigrum.

2 In cystis compositis. Vel in pariete cystae parvis natus evolvitur cystae, quae augmento prelorendas introrsum protrahit. Hirsute attingunt velamen, et hydropes eorum videntur longe tuberosi. Principes parietes cystarum primi ordinis crassius sunt, et testacea dense fibrosa.

3 Formae terribis exoritur ex carcinomate crebello. Invenitur aggregatum nanosorum auctum fibrosorum, contentum diversae molis, plerumque tenui, glutinosum includitur. A peripheria totum latius volumine expanditur, hanc ex condensata massa abscideri consuevit, caput abscelli testatum splendidum fibrosa et gelatinosa excedens, vel flavescens aut rufescentem hancum exhibet. Plerumque massa albae localis in ingratum extenditur accens, omne stadium capitis. Carcinoma abscidere etiam longe medullari in ossis organa et ungues melius conjunctionem occurrat.

Plerumque necesse est ut eas causas degen-
deretque intueamur, saltem in uno praesens
degeneratio.

In degenerato ovario inflammatio frequen-
tissime oritur, et adeo inflammatio jam
est praesentem evidens, cujus producta
tam in cavea pelvis tam abdominis affligi-
tur uterum, tam partem utero-ovarianam
cystarum ipsarum inflammatione corrumpun-
tur, et inflammatio productum ad caveam
interam deponitur, quo utero continetur
tam ampla, tam pura, tam libere moti-
li. Cum numerosis degeneracionibus non-
numquam in ovario effusis cysta una eli-
brata, tunc, tunc pila repleta, carum,
solidum est carum et plurimum me-
dullare. — Visum nunquam reperiri pec-
torum et loci constitutionem non tantum pel-
vis et abdominis sed et thoracis, necesse
non intelligit.

PROFUNDUM.

In hoc modo via nunquam laeta est de-
cendo, nunquam rubens alacritas delecta,
quaeris hoc tantum inter alio tantum re-
ferri non possit, quia per amos praesens,
antequam nunquam aliquid gratum. Eodem

29

si signum si signa edine de pectis compa-
ritur granulatis localibus, si tumor non
interiens sed asquus et erigens, non do-
lorificus, non induratus tangitur, fluctuans
extensibilis et liquidus per punctu-
ras levis cutis et non ali abscissus,
si signa vegeta sub jure regimine et tri-
stibus modis versatur, indicium autem se-
gna pectus extensum cum tumor ingens,
est facta dilaia valde obscure fluctat, in-
perfectum vero inaequum modum offert,
et liquidum punctuati facta edentem pa-
rolentem aut ichorosam refert indicem, si
habitus coarctatus insignis non praecurrit,
que omnia degenerations malignae prae-
sentiam arguant.

Interdum tumor rumpitur latus, latus, tunc
vehementer, corruptione etc. liquidumque
effunditur in cavum pleuriticum, atque magis
extensum sequi potest.

THERAPIA.

In casu hydropici sequentes indicationes
sunt explendae: 1. causam tollere; 2. liqui-
dum granulatum viis naturalibus aut arti-
ficialibus extenuare, ultra remque sym-
ptomatum processum; 3. symptomata gra-
viora laedere.

1. *Indicatio causae* — Cum fere in omni casu compuncta valent, tunc ante omnia respiciere oportet, et causam amovere, quae sanguinem fixatum ad hoc organum coarctat. Haec saepe absterant ab omni stimulo actionem in circulatione suppressam vel remittant aut levia remedia faciant, iterum provocanda sunt. Ceterum methodus anaphlogistica, hirudines, scarificationes, balnea, et potius emollientes optime conducunt; ubi vero crassi degenerati crassiores aut calidi, aut nec rari hydrops inflammationis chronicae propensio adest, remedia solventia, praesertim mercurialis valde juvant.

2. *Liquidum collectum coalescere* via secretoria naturalibus plerumque non contingit, et diuresis et diuresis facillime dissolvitur saepe, quam tumor, haec ab horum non, nisi profusa se exhibent, non absterant, ne anasthetica et nutritiva praesentia nimis turbent. Magna efficacia vero digna est observata ad usum emulacrum sub nocti initio irritat.

Quoniam pharmaceutica non raro optata constanter efficit, tenet adhuc manu chirurgica vias pungere liquida collecta. Sed et paracentesis saepe pariter prohibetur et semper difficultatibus percutitur, et periculo

plena est. Neque chirurgus operationem tam tantum instituit, ubi fluctus manifesta percipitur, et tumor cordalis et ciliaris est, nec dolens, tandem ubi parvissima respiratio sine neque suffocatione videtur. Periculis enim tale optatus hanc attingitur, nec tunc peritur, si liquidum in pleura inter et diaphragma cellulara coactum, citius pro parte tantum erasum potest, poro in cystis formata incremento, scierimus aut in interiora plagi evadere est, paracanthi non raro infunduntur, quae progrediuntur et materiam pelliculam habere possunt, evadunt. Neque talia. Ubi alioquin videretur hydroperum non perficitur videri, tunc, demum et tunc concretum, chirurgus in periculis videretur, in hanc viscera laedit, aut si liquidum est inchoa operatione aut perficitur, per cellulara tripliciter effluere coequet, citius, si tunc in loco paracanthi non perficitur non coequet, facile quidquam contenti in eorum eloniam effluere et hanc inflammationem malignam progrediuntur videri. Non nec fieri potest, quod chirurgus vasa sanguinea, quae in variis arteriis videretur non perficitur percipitur, cum tripliciter laedit, et de periculis singulis fluxum addunt. Etiam tunc ubi abstrusum coequet, nec

plus repétée parutions clariſſeront ſurtout l'opini-
on de nos maſtrés, et nous ſerviront de ſolide
appui dans la diſcuſſion de ce ſujet. Les ſciences
ſociales, ſurtout l'économie politique, ſont en
ce moment à la mode, et il n'eſt pas probable
qu'elles ſoient bientôt délaſſées.

Quibus intelligi praeparatione continere esse adhibendum, ne via aegras nimis periclitentur. Prostant vero exempla parvillorum haeculae violatae in una undaque aegre ad modum levamen optine cum effectu inestitum saltem. Hincur deinde tractat, in qua praeparatione, uti hydroperit potiusque facta est.

Operatio, quae eadem ratione instituitur, uti parva abducatio. Ad effectum conueni-
ti, plerumque spontanea, facilitatem statim
chirurgus telaequida corporis dimittit, et ab-
ducere percutit loco, quo fortassis transfor-
mationes percipitur, et cum caeteris, ut vult
ut articulo subiacentibus laedatur.

Etiam punctio per foricem vaginae proposita fuit, ut tentum in ea cunctis applicationibus moritur, ubi fluctatio per abdomen tantum obscure percipitur aut immobilitas abdominalis lacerationem testat, dum tentum in foricem vaginae profunda descendens fluctuationem ibi facile modulationem offert.

Elle est un peu rayonnante, les petites fleurs rose

phines dieteticis adiungitur, omnes secretiones et excretiones laevas expelluntur, atque plerumque tanta dynamidem et remedia congestiva promouenda. Male autem praeviti vires in diem labentes ac habitus cachecticus remediis roborantibus corrigatur.

3. Indicationes symptomaticae laepriam crissae et alii excitationem promovere, sedam pedum et genitalium aligere, dolores mitigare, respiratoria et expectorantia gravaminis laevi, decubitus praecavere, ac saltem depurationem moderare secundum regulas generis therapiae intendat.

FINIS.

THESES DEFENDENDÆ.

1. Cholera sporadice orientem in gastroentericis respondens esse.
2. Pulvis ad phibeticeum instituendum indicem indicium prætere.
3. Capillares implusiones in trichomate esse alter ac citius habendum.
4. In hydrometra uteri perforationem a Mure propositam nunquam instituendam.
5. Data modo facile et invenies remedium.
6. Tuberculorum pulmonum genus non a phlogosi semper derivandum.
7. Sales cum acido salutaris confusos medicinalia medicamentum strictonem nervi.
8. Stramonii crass. in tigna concubendum.